

# Manejo de lesiones autoinflamatorias en paniculitis lipoatrófica generalizada: Reporte de un caso

Vázquez-Sánchez, J.M.<sup>1</sup>; Pérez-Martín, M.A.<sup>1</sup>; Martín-Romero, I.<sup>1</sup>; Almazor-Sirvent, A.<sup>2</sup>

1. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, 2. Universitat de Barcelona

## Introducción

La **paniculitis lipoatrófica generalizada (PLG)** es una enfermedad inflamatoria cutánea con brotes bifásicos de inflamación con nódulos subcutáneos seguidos de una atrofia permanente de tejido adiposo. Afecta preferentemente al género femenino con un comienzo clásico entre los 3 y 13 años de edad.

## Presentación del caso

**Historia actual:** Mujer de 19 años de edad diagnosticada de PLG desde 2010 en situación de enfermedad avanzada refractaria a tratamiento. Grupo III de ACT

### Antecedentes:

- 2019:** Esclerodermia generalizada. Compromiso funcional
- 2020:** Pérdida de peso refractaria a nutrición enteral. Actualmente IMC: 11,7
- 2021:** Fallo hepático, diabetes mellitus y primeras lesiones

## Problema actual

### Lesión cutánea en primer dedo de mano izquierda



31 agosto



10 septiembre

## Abordaje de lesiones

Se empleó la herramienta T.I.M.E.



1

### Traslado a domicilio

**Resvech 2.0:** No valorable

**Prioridad:** T.I.M.E.

- Control de dolor (intenso)
- Prevención infección
- Desbridamiento enzimático



16 septiembre

2

### Exposición de tendón

**Resvech 2.0:** 13

**Prioridad:**

- Control de dolor (moderado)
- Prevención infección
- Control exudado con alginato



8 noviembre



Mano y cadera izquierda

3

### Rebote generalizado

**Resvech 2.0:** 19

**Prioridad:**

- Control de dolor (intenso)
- Control ansiedad
- Desbridamiento autolítico



22 noviembre



Mano y cadera izquierda

4

### Epitelización

**Resvech 2.0:** 4

**Prioridad:**

- Epitelización (Ácidos grasos)
- Rehabilitación



14 diciembre

## Conclusiones

El correcto **manejo de las lesiones cutáneas** es un tratamiento necesario que debe ser tenido en cuenta en el abordaje integral de la persona que padece PLG junto con el **tratamiento farmacológico, nutricional y emocional** que el equipo presta al paciente y su familia. El trabajo en equipo y la toma de decisiones anticipada en el caso de la PLG resultó fundamental para priorizar las necesidades de la paciente y la actuación temprana ante brotes de lesiones cutáneas recurrentes.

## Referencias

- Aguirre-Martínez, I. L., & Torrelo, A. (2021). Lipoatrophic panniculitis of children. *Clinics in Dermatology*, 39(2), 220-228. <https://doi.org/10.1016/j.clinidermatol.2020.10.010>
- Bowers, S., & Franco, E. (2020). Chronic wounds: Evaluation and management. *American Family Physician*, 101(3), 159-166. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32003952/>
- Harries, R. L., Bosanquet, D. C., & Harding, K. G. (2016). Wound bed preparation: TIME for an update: Wound bed preparation update. *International Wound Journal*, 13 Suppl 3(S3), 8-14. <https://doi.org/10.1111/iwj.12662>